

PATIENTVEJLEDNING

Fuldspyt-undersøgelse (måling af spytsekretion)

Hvad er en fuldspyt-undersøgelse?

Ved en fuldspyt-undersøgelse måler man den opsamlede spytmenge produceret på 15 min. for at afsløre nedsat spytsekretion. Manglende spytsekretion kan være et symptom på Sjøgrens syndrom, som er en kronisk gigtsygdom.

Er der forberedelser før en fuldspyt-undersøgelse?

Det er vigtigt for undersøgelsesresultatet, at du ikke spiser eller drikker (heller ikke skyller munden) mindst 1 time før undersøgelsen. Du skal holde pause med eventuel medicin, som påvirker spytsekretionen. Spørg din læge.

Hvor længe varer en fuldspyt-undersøgelse?

Undersøgelsen varer 15 min.

Hvordan foregår en fuldspyt-undersøgelse?

Undersøgelsen foretages af en sygeplejerske i ambulatoriet på Dansk Gigthospital. Du får udleveret et måleglas, hvor du over det næste kvarter skal opsamle mundvand. Dvs. du må ikke synke mundvandet, men i stedet spytte det ud i måleglasset. Sygeplejersken måler herefter mængden af mundvand/spyt. Undersøgelsen er simpel og smertefri.

Hvornår får man svar på en fuldspyt-undersøgelse?

Svaret kan aflæses umiddelbart efter undersøgelsen. Din læge vil give dig svar på, hvad resultatet betyder for dig.



Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte ambulatorie-sygeplejersken på telefon 73 65 40 33.